


営農情報

春・夏のレザー管理について

3月から気温も上がり、日差しも強くなってきます。二重ビニールをしている方は除去を、遮光資材を掛けていない方は被覆をしましょう。

現在、萌芽数が多いので、新芽が曲がらないように早めの整枝をお願いします。



経済部
営農販売課
営農指導員
盛山 裕希

・年間栽培管理表

	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			備 考																										
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下																														
遮光資材の被覆管理	防風ネット(開年)																		遮光資材被覆																		張り替え時期は、年毎の気象状況に応じて調整する。																										
一年目	施肥開始						定植満期						肥培管理												収穫									一年目の収穫開始は株の生育状況をみて行う。植え替えは、収量が低下したら行う。																													
二年目以降	(石灰)																		(石灰)																		毎月追肥																		(石灰)								

収穫までの目安は新芽発生から、夏が60~80日、秋が70~90日、冬が90~110日程度。

1. 灌水

- ・土壌を軽く握って、団子状ができる程度に灌水しましょう。

2. 気温

- ・季節の変わり目には、こまめにサイド・谷のビニールの開閉をしましょう。
- ※レザーの生育適正温度は18~23度

3. 遮光

- ・中二重遮光資材や防風ネット等を被覆し遮光率70%程度にしましょう。

4. 整枝・収穫

- ・芽を出やすくし、葉が曲がらないように、こまめに整枝・収穫しましょう。

5. 追肥

- ・生育と土壌診断に応じて、適正な施肥をお願いします。
- ※適正な株の芽は白く、肥料が多すぎると芽が茶色っぽくなります。

6. 病虫害

- ・葉枯れ病
排水を良くして、病葉はハウスから必ず持ち出しましょう。
- ・アザミウマ類 (スリップス)
発生がみられたら、こまめに薬剤散布を行いましょ。
- ・ヨトウ類
入り口の寒冷紗を降ろし、外からの進入を防ぎましょ。
- ・アブラムシ
新芽や新葉の先に発生しやすいので、防除に努めましょ。
- ・コガネムシ
入り口の寒冷紗を降ろし、外からの進入を防ぎましょ。



獅子座
7/23
~ 8/22

【全体運】 春がそこまで来ています。暖かくなってからすることの準備を先取りすると、幸運の呼び水に。新プランにツキ
【健康運】 リラックスを心掛けて。温かい飲み物を
【幸運を呼ぶ食べ物】 レモン