

## 2. 除草剤

### (雑草生育初・中期一発剤)

- サラブレッド KAI 1キロ粒剤・・・1 kg /10a  
(移植直後～ノビエ 2.5 葉期まで)  
(但し移植後 30 日まで)
- サラブレッドフロアブル・・・500ml/10a  
(移植直後～ノビエ 2.5 葉期まで)  
(但し移植後 30 日まで)
- ミスターホームランLジャンボ・・・10 個 (500 g) /10a  
(但し、移植後 5 日～2 葉期 移植後 30 日まで)

### ※フロアブル剤・ジャンボ剤の使用上の注意点

- 1) 散布時は湛水状態で、水深 3～5cm にしましょう。  
散布後は 3～4 日はそのままの状態にしておき、すぐに落水やかけ流しはしないようお願いします。
- 2) 風の強い日の散布は避けましょう。一方に薬剤が偏ると薬害を起こすおそれがあります。

### (雑草生育中後期剤)

- クリンチャー1キロ粒剤・・・1 kg /10 a (移植後 7 日～ノビエ 4 葉期まで)  
(湛水散布) (但し、収穫 30 日前まで)
- クリンチャーEW・・・100ml/10 a  
(湛水散布または落水散布) (25～100 ㍓に希釈して使用) 展着剤を加用  
移植後 20 日～ノビエ 6 葉期まで (但し、移植後 30 日まで)
- ※ヒエの残った場所 (初期除草剤の効かなかった所) に落水して散布する。
- ※広葉雑草には効果が劣るので、広葉雑草の発生している圃場では、広葉雑草に有効な剤と組み合わせて使用しましょう。
- クリンチャーバスME液剤・・・1000ml/10a (70～100 ㍓に希釈して使用)  
(落水散布または極浅く湛水して散布) 展着剤不用 ヒエ+広葉雑草  
移植後 15 日～ノビエ 5 葉期まで (但し、収穫 50 日前まで)
- バサグラン粒剤・・・3～4 kg /10a 移植後 15 日～55 日 (但し、収穫 60 日前まで)  
(落水散布または極浅く湛水して散布)
- バサグラン液剤・・・500～700ml/10a (70～100 ㍓に希釈して使用)  
(落水散布または極浅く湛水して散布) 移植後 15 日～55 日 (但し、収穫 50 日前まで)
- ※広葉雑草 (初期除草剤の効かなかった所)
- フォローアップ1キロ粒剤・・・移植後 20 日～ノビエ 5 葉期 (但し、収穫 60 日前)  
(湛水处理) 広葉+ヒエ

### (ウキクサ類、藻類)

- モゲトン粒剤・・・2～3 kg /10a 藻類の多い場所部分処理  
発生始め～発生盛期 (収穫 45 日前まで)

