



営農情報



冬野菜に発生しやすい病害虫と防除

軟腐病

主な作物：白菜・キャベツ・パレイショなど
特徴：多くの種類の野菜で発生しやすく、害虫の食害痕等の傷口から侵入し、高温・多湿で発生しやすくなります。
主な農薬：コサイド 3000・Zボルドー



白斑病

主な作物：白菜・大根・南瓜など
特徴：晩秋から冬にかけて雨の多い年に発生が多く、早まき、連作、肥料切れは発生を助長する恐れがあります。
主な農薬：ダコニール 1000・アミスター 20フロアブル



べと病

主な作物：白菜・ホウレンソウ・ネギ類など
特徴：晩秋や春先の低温・多湿で発生しやすく、早まき、連作、肥料切れは発生を助長する恐れがあります。
主な農薬：ダコニール 1000・シグナムWDG



菌核病

主な作物：キャベツ・レタス・ブロッコリーなど
特徴：露地で3月から4月、トンネルでは冬の低温・多湿、気温 20℃前後で曇天が続くと発生しやすくなります。
主な農薬：アミスター 20フロアブル・シグナムWDG



アザミウマ(スリップス)類

主な作物：ネギ類・マメ類など
主な農薬：ディアナSC・モスピラン顆粒水溶剤



コナガ・ヨトウムシ類

主な作物：キャベツ・白菜などの葉物野菜
主な農薬：ディアナSC・フェニックス顆粒水和剤・プレオフロアブル



キスジノミハムシ

主な作物：大根・葉物野菜など
主な農薬：スタークル粒剤・モスピラン顆粒水溶剤



ハモグリバエ

主な作物：マメ類・ナス科など
主な農薬：ディアナSC・マラソン乳剤



幼虫

成虫

農薬の希釈倍率は作物によって異なります。使用時はラベルをご確認いただき、ご不明な点は最寄りのJA営農販売課へお尋ねください。



双子座
5/21
～6/21

【全体運】とても勢いがあります。上旬は走り抜け、下旬からはのんびり紅葉狩りなどを楽しんで。めりはりが大事
 【健康運】スポーツは記録更新のチャンス。挑戦にツキ
 【幸運を呼ぶ食べ物】トマト