



営農情報



春・夏のレザー管理について

3月から気温も上がり、日差しも強くなってきます。二重ビニールをしている方は除去を、遮光資材を掛けていない方は被覆をしましょう。

現在、萌芽数が多いので、新芽が曲がらないように早めの整枝をお願いします。



・年間栽培管理表

	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			備 考		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
遮光資材の被覆管理													防風ネット(周年)																								張り替え時期は、年毎の気象状況に応じて調整する。		
一年目				施肥耕耘			定植適期															肥培管理						収穫			一年目の収穫開始は株の生育状況を見て行う。 植え替えは、収量が低下したら行う。								
二年目以降							収穫															収穫						収穫											
	(石灰)												毎月追肥									(石灰)																	

収穫までの目安は新芽発生から、夏が60~80日、秋が70~90日、冬が90~110日程度。

1. 灌水

- ・ 土壌を軽く握って、団子状ができる程度に灌水しましょう。

2. 気温

- ・ 季節の変わり目には、こまめにサイド・谷のビニールの開閉をしましょう。
※レザーの生育適正温度は18~23度

3. 遮光

- ・ 中二重遮光資材や防風ネット等を被覆し遮光率70%程度にしましょう。

4. 整枝・収穫

- ・ 芽を出やすくし、葉が曲がらないように、こまめに整枝・収穫しましょう。

5. 追肥

- ・ 生育と土壌診断に応じて、適正な施肥をお願いします。
※適正な株の芽は白く、肥料が多すぎると芽が茶色っぽくなります。

6. 病害虫

- ・ 葉枯れ病
排水を良くして、病葉はハウスから必ず持ち出しましょう。
- ・ アザミウマ類 (スリップス)
発生がみられたら、こまめに薬剤散布を行いましょう。
- ・ ヨトウ類
入り口の寒冷紗を降ろし、外からの進入を防ぎましょう。
- ・ アブラムシ
新芽や新葉の先に発生しやすいので、防除に努めましょう。
- ・ コガネムシ
入り口の寒冷紗を降ろし、外からの進入を防ぎましょう。



双子座
5/21
~ 6/21

【全体運】 周囲から頼られそう。手助けしないとびつくりするほど非難されることも。事情を丁寧に説明することが大事
【健康運】 発熱に注意。ビタミンCを取って風邪を予防
【幸運を呼ぶ食べ物】 シイタケ