



春・夏のレザー管理について

3月から気温も上がり、日差しも強くなってきます。二重ビニールをしている方は除去を、遮光資材を掛けていない方は被覆をしましょう。

現在、萌芽数が多いので、新芽が曲がらないように早めの整枝をお願いします。



・年間栽培管理表

	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			備 考
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
遮光資材の被覆管理																																					

収穫までの目安は新芽発生から、夏が60～80日、秋が70～90日、冬が90～110日程度。

1. 灌水

- ・土壌を軽く握って、団子状ができる程度に灌水しましょう。

2. 気温

- ・季節の変わり目には、こまめにサイド・谷のビニールの開閉をしましょう。

※レザーの生育適正温度は18～23度

3. 遮光

- ・中二重遮光資材や防風ネット等を被覆し遮光率70%程度にしましょう。

4. 整枝・収穫

- ・芽を出やすくし、葉が曲がらないように、こまめに整枝・収穫しましょう。

5. 追肥

- ・生育と土壌診断に応じて、適正な施肥をお願いします。

※適正な株の芽は白く、肥料が多すぎると芽が茶色っぽくなります。

6. 病害虫

- ・葉枯れ病
排水を良くして、病葉はハウスから必ず持ち出しましょう。
- ・アザミウマ類（スリップス）
発生がみられたら、こまめに薬剤散布を行いましょう。
- ・ヨトウ類
入り口の寒冷紗を降ろし、外からの進入を防ぎましょう。
- ・アブラムシ
新芽や新葉の先に発生しやすいので、防除に努めましょう。
- ・コガネムシ
入り口の寒冷紗を降ろし、外からの進入を防ぎましょう。



獅子座
7/23
～8/22

【全体運】想定外の事態になっても慌てないように。経験者の話はとても参考になります。手を貸してもらえらることも。相談を
【健康運】けがに注意。準備運動で体をほぐしましょう
【幸運を呼ぶ食べ物】アスタバ