



春・夏のレザー管理について

3月から気温も上がり、日差しも強くなってきます。二重ビニールをしている方は除去を、遮光資材を掛けている方は被覆をしましょう。

現在、萌芽数が多いので、新芽が曲がらないように早めの整枝をお願いします。



年間栽培管理表

	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			備 考		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
遮光資材の被覆管理	防風ネット(周年)																		遮光資材被覆									張り替え時期は、年毎の気象状況に応じて調整する。											
一年目	施肥耕起						定植準備						肥培管理						収穫						一年目の収穫開始は株の生育状況を見て行う。植え替えは、収量が低下したら行う。														
二年目以降	← (石灰)																		毎月追肥						→ (石灰)														

収穫までの目安は新芽発生から、夏が60~80日、秋が70~90日、冬が90~110日程度。

1. 灌水

・土壌を軽く握って、団子状ができる程度に灌水しましょう。

2. 気温

・季節の変わり目には、こまめにサイド・谷のビニールの開閉をしましょう。

※レザーの生育適正温度は18~23度

3. 遮光

・中二重遮光資材や防風ネット等を被覆し遮光率70%程度にしましょう。

4. 整枝・収穫

・芽を出やすくし、葉が曲がらないように、こまめに整枝・収穫しましょう。

5. 追肥

・生育と土壌診断に応じて、適正な施肥をお願いします。

※適正な株の芽は白く、肥料が多すぎると芽が茶色っぽくなります。

6. 病虫害

・葉枯れ病

排水を良くして、病葉はハウスから必ず持ち出しましょう。

・アザミウマ類 (スリップス)

発生がみられたら、こまめに薬剤散布を行いましょう。

・ヨトウ類

入り口の寒冷紗を降ろし、外からの進入を防ぎましょう。

・アブラムシ

新芽や新葉の先に発生しやすいので、防除に努めましょう。

・コガネムシ

入り口の寒冷紗を降ろし、外からの進入を防ぎましょう。



獅子座
7/23
~ 8/22

【全体運】あれもこれもと思いがちですが時間は限られています。あらためて取捨選択を。下旬には勢いを取り戻し前進
【健康運】油断大敵。いつもの健康習慣をしっかり継続
【幸運を呼ぶ食べ物】パセリ